

Erstnachweis von *Horisme laurinata* SCHAWERDA  
im Saarland

von Horst SEYER

In *Nota Lepidopterologica* 4(4): 159-166 veröffentlichte REZBANYAI 1981 sein Forschungsergebnis über die Verbreitung der Geometridenarten *Horisme tersata* und *Horisme laurinata*.

Da *Horisme laurinata* für das Saarland unerwähnt blieb und mir in meiner Sammlung unterschiedlich gezeichnete Exemplare aufgefallen waren, die aus Lichtfängen in Saarbrücken stammten, vermutete ich die beiden Arten unter meinem Material. Da auch ein Vergleich mit den Abbildungen bei FORSTER & WOHLFAHRT (1978), wo *Horisme laurinata* als Unterart von *Horisme tersata* geführt wird, mich in meiner Vermutung bestätigte, ließ ich die betreffenden Exemplare durch Herrn Dr. REZBANYAI, Luzern, mit folgendem Ergebnis genitaluntersuchen:

*Horisme tersata*, Saarbrücken, Eschberg, 26.7.1969 (Präp. 5451)

*Horisme laurinata*, Saarbrücken, Unner, 1.7.1978 (Präp. 5452)

*Horisme laurinata*, ♀, Saarbrücken, Unner, 21.6.1979

Die beiden Arten scheinen unterschiedliche Flugzeiten zu haben.

Literatur

FORSTER, W. & TH. WOHLFAHRT (1978): Die Schmetterlinge Mitteleuropas V: 196. Francksche Verlagshandlung, Stuttgart.

REZBANYAI, L. (1981): Zur Verbreitung der *Horisme*-Arten *tersata* D. & S. 1775 und *laurinata* SCHAWERDA 1919 in Europa (Geometridae). *Nota lepid.* 4(4): 159-166.

Anschrift des Verfassers

Dr. Horst SEYER  
Irgendhöhe 12  
D-6600 Saarbrücken 6